Labormarker bei chronischen Entzündungen

—

Was ist kausal, was ist (nur) Epiphenomen?

18. April 2012, 15.00 Uhr

Dr. med. Volker von Baehr

Akute Entzündung

- biologisch sinnvoll
- der „Auslöser“ ist das Problem (z.B. Infektionserreger)

Chronische Entzündung

- die Entzündung selbst stellt das „Problem“ dar
- meist Folge einer „Über-/Fehlreaktion“ des Immunsystems
z.B. auf Allergene, Autoantigene, Schadstoffe, Metalle,
wenig pathogene Bakterien, Pilze oder Viren
- oft mit einer Schädigung biologischer Regulationssysteme
verbunden

Einteilung der Entzündungen nach dem zeitlichen Ablauf:

akute = plötzlich einsetzende Entzündungen

chronische = langsam, schleichend ablaufende Entzündungen

rezidivierende = wiederholt auftretende Entzündungen

Bakterien

LPS

Pilze

Partikel
(z.B. Titanoxid)

Immunkomplexe

TNF- α
IL-1
IL-6
IL-8 u.a.

**Myelomonocytaire
Entzündung**

Viren

intrazellulär
persistierende
Bakterien

Xenobiotika
(z.B. Metalle,
Acrylate,
Biozide usw.)

Allergene
(bei Sensibilisierung)

T-Lymphozyt

IFN- γ
IL-17
IL-4
IL-10 u.a.

**Lymphozytäre
Entzündung
(TH1-Immunaktivierung)**

Bakterien

Pilze

Xenobiotika
(z.B. Flammschutzmittel,
Biozide usw.)

Mastzelle

Histamin
Leukotriene
TGF- β
Serotonin u.a.

**Entzündung durch
Mastzellaktivierung
(Typ I)-allergische
Entzündung**

Die myelomonozytäre Entzündung

TNF- α und IL-1 vermitteln die systemischen proentzündlichen Effekte

Myelomonozytäre Entzündung heißt Alarm für den gesamten Organismus

Die myelomonozytäre Entzündung

IL-10 und TGF- β bremsen die Entzündung

Patient [REDACTED]	Tagebuch-Nr. 0326027647	Geburtsdatum/Geschlecht 01.01.1956 / MA	Institut für Medizinische Diagnostik Nicolaisstraße 22 12247 Berlin (Steglitz) Telefon 030 770 01-322 Fax 030 770 01-332
Eingang [REDACTED]	Ausgang 12.04.12		

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Referenzbereich
ECP i.S. (FEIA)	8.8	µg/l	< 13.3
Histamin (gesamt) i. Hep.-Bl. (EIA)	23.8	ng/ml	< 75
Kein Hinweis auf eine Mastzell-vermittelte Entzündungsreaktion			
CRP hoch sensitiv i.S. (CLIA)	2.4	mg/l	< 3.0
TNF-alpha i.S.	23.6	pg/ml	< 8.1
Interleukin 1-β i.S.	6.1	pg/ml	< 5.0
Interleukin 10 i.S.	6.1	pg/ml	< 9.1
TGF-beta i.S. (ELISA)	13.6	ng/ml	18.3 - 63.4
<p>TNF-a und IL1 zeigen als proentzündliche Zytokine eine deutliche systemische Entzündung an.</p> <p>Das erniedrigte antientzündlich wirkende TGF-b sowie das nicht erhöhte IL-10 unterstreichen den aktuell präsenten proentzündlich dominierten Status.</p>			
IP-10 i.Serum (ELISA)	211	pg/ml	< 1072
Kein Hinweis auf eine TH1-dominante systemische Immunaktivierung			

CRP hoch sensitiv i.S. (CLIA)	2.4	mg/l	< 3.0
TNF-alpha i.S.	23.6	pg/ml	< 8.1
Interleukin 1-β i.S.	6.1	pg/ml	< 5.0
Interleukin 10 i.S.	6.1	pg/ml	< 9.1
TGF-beta i.S. (ELISA)	13.6	ng/ml	18.3 - 63.4

TNF-a und IL1 zeigen als proentzündliche Zytokine eine deutliche systemische Entzündung an.

Das erniedrigte antientzündlich wirkende TGF-b sowie das nicht erhöhte IL-10 unterstreichen den aktuell präsenten proentzündlich dominierten Status.

Entzündung, Mitochondriopathie und Störung der TH1/TH2-Balance sind Hinweise auf eine Multisystemerkrankung

Untersuchung

TNF-alpha i.S.

Ein erhöhtes TNF-a spricht für eine bestehende systemische Entzündung, d.h. eine Aktivierung des Monozyten-/Makrophagensystems.

Ergebnis

23.1

Einheit

pg/ml

Referenzbereich

< 8.1

ATP intrazellulär^{oo}

Vermindertes intrazelluläres ATP als Hinweis auf eine sekundäre Mitochondriopathie (wahrscheinlich in Folge der systemischen Entzündung, siehe TNF-a).

0.88

µM

> 2.0

W.Huber, V.v.Baehr unpublished data

Inflammation

Mitochondriopathie

Stressoren wie z.B. bakterielle und virale Antigene, Pilze, Umweltallergene, Xenobiotika (Pestizide, Lösungsmittel), physische Traumata, schwerer psychologischer Stress

Abb.2 modifiziert nach Pall, Dr. (PhD) Martin L.: Explaining 'Unexplained Illnesses': Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Posttraumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome and Others, ISBN 078902389X

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Referenzbereich
DHEAS i.S. (ECLIA)	211	ng/ml	450 - 2700
Cortisol i.S. (ECLIA)	422	ng/ml	
Normwerte abhängig von der Blutabnahmezeit:			
7 - 10 Uhr	62 - 194 ng/ml		
16 - 20 Uhr	23 - 119 ng/ml		
unter Östrogen-Einfluß, Kontrazeptiva, Hormonersatztherapie:			
7 - 10 Uhr	210 - 460 ng/ml		
16 - 20 Uhr	40 - 270 ng/ml		
TNF-alpha i.S.	62.1	pg/ml	< 8.1
Hinweis auf systemische Entzündung			
Interleukin 10 i.S.	<5.0	pg/ml	< 9.1
CRP hoch sensitiv i.S. (CLIA)	3.6	mg/l	< 3.0

Warum sind erhöhte Cortisol- und erniedrigte DHEAS-Serumspiegel Folge einer systemischen Entzündung?

Entzündungszytokine beeinflussen Enzyme des Hormonstoffwechsels

Der Kortisolanstieg dient der Immunregulation über die HHN-Achse

HHN = Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse

Bakterien

LPS

Pilze

Partikel
(z.B. Titanoxid)

Immunkomplexe

Makrophage

TNF- α

IL-1

IL-6

IL-8 u.a.

Myelomonozytäre
Entzündung

Viren

intrazellulär
persistierende
Bakterien

Xenobiotika
(z.B. Metalle,
Acrylate,
Biozide usw.)

T-Lymphozyt

IFN- γ

IL-17

IL-4

IL-10 u.a.

Lymphozytäre
Entzündung
(TH1-Immunaktivierung)

Allergene
(bei Sensibilisierung)

Mastzelle

Bakterien

Pilze

Xenobiotika
(z.B. Flammschutzmittel,
Biozide usw.)

Histamin

Leukotriene

TGF- β

Serotonin u.a.

Entzündung durch
Mastzellaktivierung
(Typ I)-allergische
Entzündung

Die Lymphozytäre Entzündung (TH1-Immunaktivierung)

1. Erkennung

Antigenspezifische CD4- und CD8-Lymphozyten erkennen das Antigen spezifisch und werden aktiviert

2. Aktivierung und Vermehrung

CD4-Helferzellen unterstützen die Aktivierung zytotoxischer CD8-Lymphozyten über Zytokine wie IL-2 und IFN- γ

3. Effektorreaktion

Zytotoxische CD8-Lymphozyten attackieren die „veränderten“ Körperzellen

Typ-IV-Allergien und auch Autoimmunreaktionen „nutzen“ die selben Mechanismen !

Das TH1-Zytokin IFN- γ ist für zahlreiche systemische Entzündungseffekte verantwortlich

1.B.1.1.1.3. Andere Interferone

51 024 (Boehringer Ingelheim)

Imukin[®] Injektionslösung

Rp **FS**

Zus.: 1 Inj.-Fl. enth.: Interferon gamma-1b 100 μ g (= 2 Mio. I.E.),
5 Injektionsfl. (N2) 857,67

Anw.: Verring. der Häufigkeit schwerwieg. Infekt. bei Pat. mit sept. Granulomatose u. bei Pat. mit schwerer, maligner Osteopetrose.

Gegenanz.: Überempfindlichk. ggü. eng verwandten Interferonen.

Anw.-beschränk.: Bei Pat. mit vorbesteh. Herzerkrank. kann bei Dosen v.

Nebenw.: Neutropenie, Thrombozytopenie, Verwirrung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Ausschlag, Muskelschmerz, Gelenkschmerz, system. Lupus erythematodes, Proteinurie, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen an der Inj.-stelle, Müdigkeit, Bild. v. Autoantikörpern, AST- u. ALT-Anstieg.

Zentrales Nervensystem

Innere Organe
Herz, Leber, Magen
Genitalorgane

IP-10 - idealer Serummarker für die TH1- Immunaktivierung (IP-10 = IFN- γ -inducible protein 10)

aktivierte
TH1-CD4-Zelle

pg/ml im Serum

Patient [REDACTED]		Tagebuch-Nr. [REDACTED]	Geburtsdatum/Geschlecht [REDACTED]	Institut für Medizinische Diagnostik Nicolaistraße 22 12247 Berlin (Steglitz) Telefon 030 770 01-322 Fax 030 770 01-332
Eingang [REDACTED]	Ausgang 12.04.12			
Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Referenzbereich	
ECP i.S. (FEIA)	11.5	µg/l	< 13.3	
Histamin (gesamt) i. Hep.-Bl. (EIA)	34.6	ng/ml	< 75	
Kein Hinweis auf eine Mastzell-vermittelte Entzündungsreaktion				
TNF-alpha i.S.	11.4	pg/ml	< 8.1	
Interleukin 1-β i.S.	6.9	pg/ml	< 5.0	
Interleukin 10 i.S.	<5.0	pg/ml	< 9.1	
TGF-beta i.S. (ELISA)	55.8	ng/ml	18.3 - 63.4	
Lediglich leichte systemische Entzündungsreaktion				
IP-10 i.Serum (ELISA)	1744	pg/ml	< 1072	
Ein erhöhtes IP10 spricht für eine TH1-dominante systemische T-Lymphozytenaktivierung.				

IP-10 >> TNF-α und IL-1 ⇒ primär T-lymphozytär ausgelöste Entzündung

Eine verstärkte IDO-Aktivität hemmt den Tryptophan-Serotoninweg und steigert die Kynureninbildung

- Stimmung
- Schlaf
- Appetit
- Sexualverhalten

- Neurotoxische Wirkung
- Glutamat-Rezeptor-Wirkung
- Hemmung des Tryptophan-Transports über die Blut-Hirn-Schranke

**depressive
Symptomatik**

Deshalb sollte bei erhöhter IDO-Aktivität kein Tryptophan substituiert werden !!!

Ärztlicher Befundbericht

Patient [REDACTED]		Tagebuch-Nr. [REDACTED]	Geburtsdatum [REDACTED]	Institut für Medizinische Diagnostik Nicolaistrasse 22, 12247 Berlin (Steglitz) Tel. 77001-220
Eingang	21.07.11	Ausgang	27.07.11	

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Referenzbereich
TNF-alpha i.S.	15.8	pg/ml	< 8.1
IP-10 i.S.	1347	pg/ml	< 1072
Tryptophan i.S./EDTA-Pl.	0.46	mg/dl	0.93 - 1.70
IDO-Aktivität			
Tryptophan (basal)	3.28	µg/ml	
Tryptophan (nach Aktivierung)	0.35	µg/ml	
Ratio basal / aktiviert	9.4		1.8 - 5.6

Bei erhöhter IDO-Aktivität wird Tryptophan beschleunigt abgebaut. Dies kann die Serotonin-Synthese im ZNS beeinträchtigen. Die Metabolite des Tryptophan-Abbaus (Kynurenine) können eine depressive Symptomatik zusätzlich verstärken.

Eine mögliche Ursache der erhöhten IDO-Aktivität ist die erhöhte Freisetzung proentzündlicher Zytokine (Entzündungsursache? Anti-entzündliche Therapie?). Erhöhte Spiegel von TNF-alpha und IP-10 zeigen eine Beteiligung des gesamten Immunsystems an.

Eine mögliche Tryptophan- bzw. 5HTP-Supplementierung sollte nach Normalisierung der IDO-Aktivität bzw. unter sorgfältiger Kontrolle des Tryptophan-Spiegels erfolgen, um eine Akkumulation von Kynureninen zu vermeiden.

Bakterien

LPS

Pilze

Partikel

(z.B. Titanoxid)

Immunkomplexe

TNF- α

IL-1

IL-6

IL-8 u.a.

**Myelomonozytäre
Entzündung**

Viren

**intrazellulär
persistierende
Bakterien**

Xenobiotika

(z.B. Metalle,
Acrylate,
Biozide usw.)

T-Lymphozyt

IFN- γ

IL-17

IL-4

IL-10 u.a.

**Lymphozytäre
Entzündung
(TH1-Immunaktivierung)**

Allergene

(bei Sensibilisierung)

Mastzelle

Bakterien

Pilze

Xenobiotika

(z.B. Flammschutzmittel,
Biozide usw.)

Histamin

Leukotriene

TGF- β

Serotonin u.a.

**Entzündung durch
Mastzellaktivierung
(Typ I)-allergische
Entzündung**

Die (Typ I-)-allergische Entzündung

Auslöser einer Mastzellaktivierung

Entzündungsmediatoren der Mastzelle

Allergene bei Bindung an Mastzell-gebundenes IgE

Auslöser einer Mastzellaktivierung

Allergene bei Bindung an Mastzell-gebundenes IgE

Entzündungsmediatoren der Mastzelle

- IL-1, IL-2,
- IL-3, IL-4,
- IL-5, IL-6,
- IL-8, IL-10,
- IL-13, TNF α ,
- MIPs,
- GM-CSF,
- TGF- β ,
- bFGF,
- VPF/VEGF,
- PGD₂, LTB₄,
- LTC₄, PAF,
- Histamin,**
- Serotonin,
- Heparin,
- Chondroitinsulfat,
- Chymase,
- Tryptase,
- Cathepsin G

Auslöser einer Mastzellaktivierung

Allergene bei Bindung an Mastzell-gebundenes IgE

Bakterien

LPS

Komplement

Anaphylatoxine

Neuropeptide

Endothelin-1

TNF- α , IL-1 u.a.

Oxytocin

Leukotriene

Prostaglandine

Cannabinoide

Adenosin

Histaminliberatoren

(Kontrastmittel, ASS Chemikalien, Erdbeeren, u.v.a.)

Entzündungsmediatoren der Mastzelle

IL-1, IL-2,

IL-3, IL-4,

IL-5, IL-6,

IL-8, IL-10,

IL-13, TNF- α ,

MIPs,

GM-CSF,

TGF- β ,

bFGF,

VPF/VEGF,

PGD₂, LTB₄,

LTC₄, PAF,

Histamin,

Serotonin,

Heparin,

Chondroitinsulfat,

Chymase,

Tryptase,

Cathepsin G

ECP und Histamin zeigen an, dass die Entzündung vorrangig Mastzell-assoziiert ist.

Patient [REDACTED]		Tagebuch-Nr. [REDACTED]	Geburtsdatum/Geschlecht [REDACTED]	Institut für Medizinische Diagnostik Nicolaistraße 22 12247 Berlin (Steglitz) Telefon 030 770 01-322 Fax 030 770 01-332
Eingang [REDACTED]	Ausgang 13.04.12			
Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Referenzbereich	
ECP i.S. (FEIA)	45.8	µg/l	< 13.3	
Histamin (gesamt) i. Hep.-Bl. (EIA)	122	ng/ml	< 75	
Hinweis auf eine deutliche Mastzell-vermittelte Entzündungsreaktion				
TNF-alpha i.S.	9.3	pg/ml	< 8.1	
Interleukin 1-β i.S.	<5.0	pg/ml	< 5.0	
Interleukin 10 i.S.	11.6	pg/ml	< 9.1	
TGF-beta i.S. (ELISA)	70.3	ng/ml	18.3 - 63.4	
Lediglich leichte systemische Entzündungsreaktion				
IP-10 i.Serum (ELISA)	733	pg/ml	< 1072	
Kein Hinweis auf eine TH1-dominante systemische T-Lymphozytenaktivierung.				

Die TH2-Immunaktivierung fördert die chronische Entzündung

Stressoren wie z.B. bakterielle und virale Antigene, Pilze, Umweltallergene, Xenobiotika (Pestizide, Lösungsmittel), physische Traumata, schwerer psychologischer Stress

Abb.2 modifiziert nach Pall, Dr. (PhD) Martin L.: Explaining 'Unexplained Illnesses': Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Posttraumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome and Others, ISBN 078902389X

Histamin (gesamt) i. Hep.-Bl. (EIA)	122	ng/ml	< 75
Hinweis auf eine deutliche Mastzell-vermittelte Entzündungsreaktion			
TNF-alpha i.S.	22.6	pg/ml	< 8.1
Der Befund spricht für eine systemische Entzündung			
IP-10 i.Serum (ELISA)	1433	pg/ml	< 1072
Das erhöhte IP-10 spricht für eine Beteiligung der TH1-Immunkzellen am Entzündungsprozess (Allergie, Virus, intrazellulär persistierende Bakterien u.a.).			
ATP intrazellulär ^{oo}	0.77	µM	> 2.0
(CLIA) Vermindertes intrazelluläres ATP als Hinweis auf eine sekundäre Mitochondriopathie (wahrscheinlich Folge der systemischen Entzündung).			
MDA-LDL i.S. (EIA)	74.5	U/l	< 35.0
Erhöhtes MDA-modifiziertes LDL als Hinweis auf eine signifikante Lipidperoxidation als Folge eines oxidativen Stress.			
Freies 3-Nitrotyrosin i. EDTA-Pl. ^o	3.8	µg/l	< 1
Hinweis auf nitrosativen Stress			
Zonulin i.S. (EIA)	58.4	ng/ml	< 31
Das erhöhte Zonulin im Serum spricht für eine gesteigerte intestinale Permeabilität ("leaky gut")			

d.h., dass Triggerelimination und anti-entzündliche Therapie den Circulus vitiosus stoppen kann

Die TH2-Immunaktivierung fördert die chronische Entzündung

Stressoren wie z.B. bakterielle und virale Antigene, Pilze, Umweltallergene, Xenobiotika (Pestizide, Lösungsmittel), physische Traumata, schwerer psychologischer Stress

Abb.2 modifiziert nach Pall, Dr. (PhD) Martin L.: Explaining 'Unexplained Illnesses': Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Posttraumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome and Others, ISBN 078902389X

Entzündungen und Marker im Blut nach Kausalität

infektiös

bakteriell, mykotisch

**CRP ↑, Granulozytose,
IL-1, TNF- α , IL-10**

viral

**IP-10 (IFN γ), Neopterin, sIL2R ↑,
aktivierte T-Lymphozyten**

Parasiten

Eosinophilie, IL-10

Nekrose- bedingt

**CRP ↑, Granulozytose, IL-6
LDH u.a. Enzyme ↑**

allergisch (Typ I)

Eosinophilie, ECP, Histamin

allergisch (Typ IV)

**IP-10 (IFN γ), Neopterin, sIL2R ↑,
aktivierte T-Lymphozyten**

ABER:

Die Höhe der gemessenen Entzündungsmarker ist von der Immunfunktion abhängig.

Bei gestörter Immunkompetenz sind niedrigere Spiegel an Entzündungsmarkern zu erwarten, z.B.

- unter laufenden antientzündlichen Therapien
- bei bestehenden Immundefekten
- im Alter
- bei sekundären Immundefekten bei konsumierenden Erkrankungen

Die Reaktionsbereitschaft einzelner Entzündungsmarker hängt vom Individuum ab.

- z.B. sind bei TNF- α oder IL1-Highrespondern höhere Spiegel zu erwarten.

Zusammenfassung

- Es gibt drei Quellen einer Entzündung:
 1. Monozyten/Makrophagen $\Rightarrow$ TNF- α , IL-1, CRP $\Rightarrow$ „Entzündung“
 2. T-Lymphozyten $\Rightarrow$ IFN- γ (IP-10), IL-2 $\Rightarrow$ „Immunaktivierung (TH1)“
 3. Mastzellen $\Rightarrow$ Histamin, ECP $\Rightarrow$ „TH2-Entzündung“/ „TH2-Dominanz“
- Chronische Entzündung heißt:
 1. Einwirkung von Triggerfaktoren +
 2. Vorliegen einer komplexen Regulationsstörung
- Entzündungsmarker können primär oder sekundär verändert sein
- Die Höhe der Entzündungsmarker im Blut ist auch abhängig von der Immunkompetenz des Patienten
- Das Monitoring der Entzündungsmarker stellt die Basis der anti-entzündlichen und der regulativen Therapie dar.

Wir freuen uns auf die nächste Fortbildung

Interferon-gamma – Ein Zytokin mit Januskopf

Mittwoch 2. Mai 2012, 15.00 Uhr

Dr. Volker von Baehr
Institut für Medizinische Diagnostik MVZ GbR, Berlin

Zusätzlich im Frühjahr 2012

Fortbildungsreihe Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Donnerstags 19.00 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Nahrungsmittelallergien und Kreuzreaktionen – von der Anamnese zur Diagnostik

26. April 2012, 19.00 Uhr, Dr. Volker von Baehr

Laktoseintoleranz und Fruktosemalabsorption

10. Mai 2012, 19.00 Uhr, Dr. Sabine Schütt

Zöliakie – eine autoimmun bedingte Unverträglichkeit von Gluten

24. Mai 2012, 19.00 Uhr, Dr. Sabine Schütt

Histaminintoleranz – Pathogenese, Diagnostik und Therapie

7. Juni 2012, 19.00 Uhr, Dr. Sabine Schütt